


MED
Tesis
2005.
G 993 t




UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE MEDICINA
DIRECCION DE POST GRADO

Tratamiento Quirúrgico del Hallux Valgus Mediante Osteotomía Oblicua

Hospital Obrero # 2 desde el 1 de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2004.

Autor : **Dr. Arturo Guzmán Avilés.**
Residente primer año – Traumatología
Tutor : **Dr. Ronny Saavedra Lara**
Cirujano Traumatólogo C.N.S.

**Cochabamba – Febrero
2005**


Dr. Arturo Guzmán Avilés
TRAUMATOLOGO
Mat Prof. G-104 C.N.S.


Dr. Ronny Saavedra Lara
TRAUMATOLOGO
Mat Prof. S-459 C.N.S.

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN	2
II.	JUSTIFICACIÓN.....	3
III.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
IV.	OBJETIVO PRINCIPAL.....	4
V.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
VI.	TIPO DE ESTUDIO.....	4
VII.	MATERIAL Y MÉTODOS.....	5
VIII.	CRITERIOS DE INCLUSION.....	6
IX.	CRITERIOS DE EXCLUSION.....	6
X.	MARCO TEÓRICO.....	7
XI.	RESULTADOS.....	31
XII.	DISCUSIÓN.....	34
XIII.	CONCLUSIONES.....	34
XIV.	BIBLIOGRAFÍA.....	35

Tratamiento Quirúrgico del Hallux Valgus mediante Osteotomía Oblicua.

Años 2001 – 2004 Hospital Obrero N°2 – CNS

Arturo A. Guzmán Avilés

resultados, de acuerdo a los lineamientos para la evaluación de los pacientes con Hallux Valgus de la Research Committe of American Orthopaedic Foot & Ankle Society.

I. INTRODUCCION

El proceso patológico conocido como hallux valgus es una deformidad de los pies que afecta al primer orjejo, caracterizada por la desviación lateral del mismo.

Esto produce un cuadro mucho más complejo que una simple deformidad estética, que Viladot ha definido como un “síndrome de insuficiencia del primer rayo” y que tendrá importantes consecuencias sobre la dinámica, estética y función del pie.

Clásicamente se atribuye a Laforest (1782), cirujano del rey Luis XVI, su descripción inicial, pero Schnepf cita descripciones anteriores realizadas por Legran(1731) en su obra “La toilette des pies” y por Rouselot(1769) en “L’art de soigner les pieds”. La primera ocasión en que se asigna a esta deformidad el nombre de hallux valgus se debe a Hueter en 1871 y, posteriormente, en 1876 y 1881, Morton y Reverdin, proponen por primera vez su tratamiento quirúrgico.

Su incidencia es muy alta, como ponen de manifiesto Coughlin y Thompson, sobre todo en mujeres entre los 40 y los 60 años, que ellos relacionaban con la utilización del calzado, la proporción entre hombres y mujeres está claramente dominada por la incidencia en la mujer.

Un conocimiento más exacto de la deformidad, una buena valoración de su progresión conociendo su historia natural y una adecuada atención a las causas que la originan permitirán afrontar el tratamiento de estas lesiones con grandes posibilidades de éxito a medio y largo plazo.

Tratamiento Quirúrgico del Hallux Valgus mediante Osteotomía Oblicua.

Años 2001 – 2004 Hospital Obrero N°2 – CNS

Arturo A. Guzmán Avilés

Depende del tipo de hallux valgus que tenga el paciente. Existen más de 130 técnicas quirúrgicas para el tratamiento del hallux valgus, el médico escoge entre estas técnicas la que más se adecue al paciente.

En los casos leves se practican técnicas quirúrgicas más sencillas, en los casos severos hay que realizar generalmente osteotomías en el metatarsiano.

Consideramos que la técnica de Osteotomía Oblicua, vislumbra los resultados de las técnicas tradicionales.

El hallux valgus es causado por una interacción entre un calzado inadecuado y una predisposición genética. En las poblaciones que no usan calzado la enfermedad prácticamente no se conoce. También llama la atención que casi todos los pacientes que acuden a la consulta tienen un familiar con la enfermedad. La modificación del calzado, aumentando el ancho de la punta, y el uso de dispositivos como parches o espaciadores interdigitales puede disminuir los síntomas en las formas leves. Sin embargo el tratamiento definitivo es el quirúrgico.

II. JUSTIFICACIÓN.

El motivo por el cual se decide efectuar este estudio es dar a conocer la técnica de Osteotomía Oblicua para las cirugías de Hallux Valgus, como una alternativa quirúrgica en la solución definitiva de esta patología, ya que se ha visto la necesidad de el paciente de poder retornar prontamente a su actividad diaria, y de solucionar la problemática que conlleva el tener que calzar zapatos que provoquen dolor al usarlos, así mismo pensando en

Tratamiento Quirúrgico del Hallux Valgus mediante Osteotomía Oblicua.

Años 2001 – 2004 Hospital Obrero N°2 – CNS

Arturo A. Guzmán Avilés

lo estético que tal vez es uno de los aspectos que más satisfacción se alcanza con esta técnica.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En vista de ser la osteotomía oblicua una de las técnicas más utilizadas en el servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Obrero #2, el propósito es promoverla como la técnica ideal para el tratamiento de hallux valgus moderado. Para lo cual se evaluará la técnica de acuerdo a parámetros clínicos y radiográficos pudiendo así concluir satisfactoriamente este estudio.

IV. OBJETIVO PRINCIPAL.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la eficacia del tratamiento quirúrgico del hallux valgus mediante la técnica de Osteotomía Oblicua. Y así dar una pauta para la uniformidad de criterios quirúrgicos en cuanto a la resolución de este problema traumatológico.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- ❖ Establecer la incidencia de Hallux Valgus según sexo y edad
- ❖ Realizar una evaluación en base a parámetros clínicos radiológicos
- ❖ Identificar las complicaciones durante las cirugías y posterior a las mismas

VI. TIPO DE ESTUDIO.

Se realizará un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal de Hallux Valgus en Pie intervenidas quirúrgicamente mediante Osteotomía Oblicua en el Servicio de Traumatología del Hospital Obrero N° 2. en un periodo de 4 años comprendido entre enero de 2001 a diciembre de 2004.