


54

MED.  
Tesis  
C331v  
2008

54. ✓



**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN**  
**(UMSS)**  
**FACULTAD DE MEDICINA**  
**ESCUELA DE GRADUADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA**



***VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA  
ETAPA DE EMBARAZO EN  
PACIENTES DE LA MATERNIDAD  
DEL HONº2 C.N.S.***

**Autor:** Dra. Carola Carvajal Garcés.

**Tutor:** Dr MSc. Henry Solís Fuentes.

U.B.



c. 18.02.08

**DEDICATORIA**

**Cochabamba Febrero 2008**

*A mi Padre celestial por sus momentos difíciles.  
A mi amado esposo Jaime por su amor y apoyo incondicional.  
A mis hermosos hijos Eric y Grace por ser mi inspiración de superación.  
A mis padres quienes siempre creyeron en mí y han sido siempre un ejemplo en mi vida.*

70 ✓

# TABLA DE CONTENIDOS

Resumen

## RESUMEN

### CAPITULO PRIMERO

1.1. JUSTIFICACION .....	2
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	3
1.3. OBJETIVOS .....	4
1.3.1. OBJETIVO GENERAL .....	4
1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	4
1.2. DISEÑO METODOLOGICO .....	5
3.1 TIPO DE INVESTIGACION .....	5
3.2 TIPO DE VARIABLE .....	5
3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE .....	5
3.2.2 VARIABLE DEPENDIENTE .....	5
3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ...	7

### CAPITULO SEGUNDO

2.1 MARCO TEORICO .....	11
-------------------------	----

### CAPITULO TERCERO

3.1 RESULTADOS .....	39
----------------------	----

### CAPITULO CUARTO

4.1 DISCUSION .....	51
4.2 CONCLUSIONES .....	57
4.3 RECOMENDACIONES .....	58

### REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

### ANEXOS

## Resumen

**Objetivo.** Conocer las características de la violencia intrafamiliar durante el embarazo en las pacientes que acuden a consulta externa del servicio de Gineco-Obstetricia del HON°2 C.N.S.

**Material y métodos** La fuente de la información fueron los datos de una encuesta aplicada a mujeres en su último trimestre de embarazo. Con base en esta se realizó un estudio transversal, descriptivo.

**Resultados** Del total de la población, 107 mujeres (72%) de la población manifestaron ser maltratadas en alguna forma: Psicológicamente, 105(70%) Físicamente 90 (60%) Sexualmente 54 (36%) durante el actual embarazo. La violencia psicológica, se incremento de manera significativa durante el embarazo de 112 embarazadas que contestaron tener violencia psicológica antes del embarazo este aumento a 148 durante el embarazo.

La violencia física y la sexual no experimentan un cambio estadísticamente significativo al comparar los valores antes y durante el embarazo.

En la mayor parte de los casos (98%) el agresor fue el cónyuge. Las variables que se asociaron positivamente con violencia en el embarazo fueron: la escolaridad, las mujeres con bajo nivel de instrucción eran más propensas a ser víctimas de violencia intrafamiliar en comparación de aquellas con escolaridad superior. Antecedentes de violencia en la niñez estaba asociado con violencia en el embarazo y las mujeres que padecieron violencia en alguno de sus embarazos, informaron con mayor frecuencia haber sufrido violencia por parte de su pareja en el último año previo a la entrevista. Hay una percepción de grave

disfuncionabilidad familiar por parte de las gestantes sometidas a violencia intrafamiliar en el embarazo.

## CAPITULO PRIMERO

La complicación mas frecuente encontrada es la amenaza de parto pretermino.

**Conclusión.** Los resultados de este estudio muestran que la prevalencia de violencia en el embarazo es alta y existe un aumento importante de violencia psicologica en embarazo.

Desde hace varios años se ha insistido en que la violencia contra las mujeres es también un problema de salud pública (OPS, 1994) que puede llegar a representar la pérdida de hasta una quinta parte de los años de vida saludable en un periodo reproductivo entre las mujeres afectadas (Helse, 1994) ya que provoca una carga considerable en los servicios de salud, disminuyendo la posibilidad de responder eficazmente a otros tipos de problemas de salud.

La violencia familiar contra la mujer constituye uno de los problemas sanitarios de mayor importancia epidemiológica en la época actual, pues se estima que una de cada diez mujeres han sufrido, o sufren algún tipo de maltrato en el hogar la cual se constituye en un obstáculo que impide la realización plena de los derechos humanos.

Dentro de este panorama se circunscribe el fenómeno de violencia contra las mujeres, como un aspecto especial y llamativo por ser ella una de sus principales víctimas. En el mundo la violencia en el hogar es un evento que domina la vida diaria de nuestra sociedad donde la violencia es cotidiana, pasando algunas veces inadvertida.

Por la violencia intrafamiliar la mujer maltratada desarrolla un cuadro de estrés permanente que se asocia con depresión, angustia, baja autoestima, aislamiento, en la población obstétrica provoca cuadros de estrés, depresión, ansiedad, infecciones, anemias, abortos espontáneos, amenazas de partos preterminos, recién nacidos con insuficiencia ponderal, incluso muerte fetal, cuidados prenatales inadecuados y mayores consultas al médico

(Pekín, 1998). (3)

## CAPITULO PRIMERO

### VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA ETAPA DE EMBARAZO EN PACIENTES DE LA MATERNIDAD DEL HOSPITAL OBRERO N°2 C.N.S.

#### Introducción

Desde hace varios años se ha insistido en que la violencia contra las mujeres es también un problema de salud pública (OPS.1994) que puede llegar a representar la pérdida de hasta una quinta parte de los años de vida saludable en un periodo reproductivo entre las mujeres afectadas (Heise, 1994) ya que provoca una carga considerable en los servicios de salud, disminuyendo la posibilidad de responder eficazmente a otros tipos de problemas de salud.

La violencia familiar contra la mujer constituye uno de los problemas sanitarios de mayor importancia epidemiológica en la época actual, pues se estima que una de cada diez mujeres han sufrido, o sufren algún tipo de maltrato en el hogar la cual se constituye en un obstáculo que impide la realización plena de los derechos humanos.

Dentro de este panorama se circunscribe el fenómeno de violencia contra las mujeres, como un aspecto especial y llamativo por ser ella una de sus principales víctimas. En el mundo la violencia en el hogar es un evento que domina la vida diaria de nuestra sociedad donde la violencia es cotidiana, pasando algunas veces inadvertida.

Por la violencia intrafamiliar la mujer maltratada desarrolla un cuadro de estrés permanente que se asocia con depresión, angustia baja autoestima, aislamiento, en la población obstétrica provoca cuadros de estrés, depresión ansiedad, infecciones, anemias, abortos espontáneos, amenazas de partos pretérminos, recién nacidos con insuficiencia ponderal, incluso muerte fetal cuidados prenatales inadecuados y mayores consultas al médico

(Pekín, 1998). (3)

Así, la probabilidad de violencia durante el embarazo se incrementa en condiciones de alta vulnerabilidad física, psicológica y social de la mujer. Esta agresión pone en peligro no solo una sino dos vidas.

Paradójicamente, la violencia intrafamiliar es el tipo de violencia menos conocido, pues se oculta en el espacio privado de lo doméstico. Aunque se presenta en mayor o menor grado en todas las clases sociales, muchas veces se ha asociado con las clases sociales bajas; esta percepción es producida porque es más visible y pública en estos estratos.

Aunque este es un problema de gran magnitud, el desconocimiento por parte del sector salud ayuda al subdiagnóstico.

En el ámbito de violencia contra la gestante se encuentra que el agresor es alguien cercano como esposo, novio, compañero o familiar. Existe una serie de condiciones que hacen que el riesgo de violencia durante el embarazo aumente: embarazo a edad temprana, bajo nivel socioeconómico, uso de alcohol y drogas por el compañero, madre soltera y embarazo no deseado. (Okolocha, 2003).(2)

Igualmente el maltrato a las embarazadas podría aumentar por múltiples razones: como el embarazo no deseado, celos de la pareja, estrés por carga económica y el estado de ser indefensa.

## JUSTIFICACION DEL PROBLEMA

Hay estudios que muestran que el maltrato a la mujer es un hecho frecuente que puede empezar o empeorar durante el embarazo.

La prevalencia de abuso durante el embarazo varía según el tipo de definición de violencia utilizada, según la forma en que dichas definiciones son operacionalizadas y según la población estudiada. Por ello, en la bibliografía internacional se reportan prevalencias que fluctúan entre 25- 50%(Helton et al., 1987). (4)

En vista que en incontables oportunidades en los centros de salud se atienden embarazadas con complicaciones como la amenaza de parto pretermino, bajo peso al nacer, aborto, sin imaginar que muchas de ellas podría tener su origen en hechos de violencia domestica.

Por ser la violencia domestica un tema poco explorado y debido a la existencia limitada de investigaciones de esta naturaleza, se justifica la realización de una investigación que permita identificar la existencia de maltrato en la mujer gestante, abriendo el campo a nuevos estudios y motivando la creación de programas educativos dirigidos a la familia, permitiendo igualmente el diseño de campañas educativas, que impulsen en las mujeres maltratadas la denuncia respectiva.

También esta investigación permitirá que la institución hospitalaria, sede de la misma pueda identificar, prevenir y tratar la violencia domestica contra la mujer embarazada y buscar una solución oportuna ante dicha situación con la consecuente disminución del riesgo, de los casos y de las complicaciones obstétricas

En Bolivia el tema ha permanecido prácticamente inexplorado. Por ello, tal como se señala en la bibliografía reciente, existe la necesidad de estudiar con mayor detenimiento si la violencia aumenta disminuye o permanece igual durante el embarazo en comparación con los periodos previos y posterior al mismo.

## PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se ha documentado una fuerte asociación entre ser golpeadas antes del embarazo y el riesgo de serlo durante la gestación. Mas aun se ha reportado que la prevalencia de abuso durante la gestación fluctúa entre 1-25% según la nacionalidad, el grupo étnico, la cultura.

Webster (2) documento que las redes de apoyo de la mujer maltratada durante el embarazo son más débiles que en las no embarazadas.