



Universidad Mayor de San Simón
Escuela Universitaria de Posgrado
Facultad de Medicina
Escuela de Graduados y Educación Continua
**DIPLOMADO EN SALUD PUBLICA MENCION
ENFERMEDADES TROPICALES**



**INDICACIONES DE CESAREA Y FACTORES
ASOCIADOS EN EL
HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES
IBUELO - TIRAQUE COCHABAMBA 2003-2005**

ELABORADO POR: Dra. Miriam Pardo Novak

TUTOR: Dr. Adolfo Ventura Flores

Cochabamba, julio de 2007

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	4
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.....	4
1.1.1. DEFINICION DEL PROBLEMA.....	6
1.2. JUSTIFICACION.....	6
2. OBJETIVOS.....	6
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	7
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	7
3. MARCO TEORICO.....	7
3.1. DEFINICIÓN DE OPERACIÓN CESAREA.....	7
3.2. EPIDEMIOLOGIA DE LA OPERACIÓN CESAREA.....	7
3.3. TIPOS DE CESAREA.....	8
3.4. INDICACIONES MÁS FRECUENTES DE LA OPERACIÓN CESAREA.....	10
3.4.1. CESAREA PREVIA.....	14
3.4.2. SUFRIMIENTO FETAL.....	16
3.5. REQUERIMIENTOS PREOPERATORIOS.....	26
4. MARCO METODOLÓGICO.....	27
4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN.....	27
4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	27
4.3. UNIVERSO Y MUESTRA.....	28
4.4. FUENTES DE INFORMACIÓN.....	28
4.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.....	28
5. RESULTADOS.....	29
5.1. INDICACIONES MÁS FRECUENTES DE CESÁREAS.....	29
5.2. ALGUNOS FACTORES ASOCIADOS A LAS INDICACIONES DE CESAREA.....	31
5.3. OTRAS INDICACIONES MENOS FRECUENTES DE CESAREA.....	34
6. CONCLUSIONES.....	38
7. RECOMENDACIONES.....	39
8. BIBLIOGRAFÍA.....	40

RESUMEN

La investigación se realiza en el Hospital San Martín de Porres Ibuelo ubicado en la Provincia Tiraque Departamento de Cochabamba, dependiente de la Iglesia Católica de la Prelatura de Aiquile, que presta atención integral con el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).

La operación cesárea es la intervención quirúrgica que tiene por objeto extraer al feto, vivo o muerto, a través de laparotomía e incisión de la pared uterina, después que el embarazo ha llegado a las 27 semanas. Desde su origen está destinada a salvar vidas ya sea de la madre o el recién nacido, teniendo presente la correcta indicación del mismo.

Practicar o no una operación cesárea es un dilema cotidiano de la Obstetricia, de hecho la cesárea es la intervención quirúrgica realizada con mas frecuencia en muchos servicios de Obstetricia, dichas intervenciones quirúrgicas no solo desvían recursos necesarios para atender otros problemas de salud más urgentes si no que exponen a las madres y a sus hijos a riesgos innecesarios. Estos aspectos permiten identificar las indicaciones médicas de la operación cesárea, a determinar si la edad de la paciente y el grado de instrucción son factores asociados a la operación cesárea, y el tipo de ingreso de la paciente al hospital.

Los resultados que se obtendrán servirán a la Institución y al personal que trabaja en ella, para conocer cuantas cesáreas se realizan en el Centro, y/o los factores asociados identificados en el estudio tendrán influencia significativa en el medio.

Los resultados obtenidos del total de la muestra constituyen indicadores que expresan que la principal causa de cesárea se presenta en pacientes con Cesárea Previa, Desproporción Céfalo Pélvica (DCP), Parto Prolongado (PP), Pélvico, Descenso Detenido de Presentación (DDP), y Desprendimiento Prematuro de Placenta Nomo Inserta (DPPNI). Los factores asociados más frecuentes están dados en pacientes con un parto o ninguno, abortos, analfabetismo, educación primaria, estado civil, y las referencias y/o ingresos espontáneos del área o fuera del mismo.

**INDICACIONES DE CESÁREA Y FACTORES ASOCIADOS
EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES
IBUELO – TIRAQUE COCHABAMBA 2003-2005**

1. INTRODUCCION

La resolución quirúrgica de los eventos obstétricos a través de la operación cesárea, constituye uno de los avances más importantes de la medicina peri natal contemporánea y ha tenido indiscutiblemente un impacto extraordinario en la disminución de la mortalidad materna y peri natal. Los aportes científicos y tecnológicos que ocurrieron en el siglo XX, que permitieron la introducción de técnicas quirúrgicas con asepsia y anestesia confiables y de métodos sofisticados para la detección temprana del sufrimiento fetal agudo y crónico, contribuyeron en forma por demás importante al incremento en el uso de la operación cesárea que se observó en la década de los años sesenta en todos los países alrededor del mundo.

Sin embargo, en épocas recientes ha ocurrido un aumento considerable en la práctica innecesaria de la operación cesárea, que ciertamente no es inocua y conlleva riesgos inherentes, quirúrgicos y anestésicos, con lo que esta técnica operatoria pierde su enorme efecto benéfico de salvar vidas de madres y recién nacidos cuando esta bien indicada. El incremento tan notable en nuestro país en el número de cesáreas sin indicaciones justificadas en las instituciones del sector público y privado, ha sido motivo de preocupación para el Sistema Nacional de Salud.

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

EL Hospital San Martín de Porres ubicado en la localidad de Ibuelo provincia Tiraque del Departamento de Cochabamba, es considerado un establecimiento de segundo nivel de atención, es una entidad perteneciente a la iglesia Católica dependiente de la Prelatura de Aiquile en convenio con la Alcaldía de Tiraque en lo referente al Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). Presta atención en los servicios de medicina interna, pediatría, gineco obstetricia, rayos X, laboratorio y farmacia. Asimismo cuenta con ambientes adecuados e instrumental necesario para la atención de estos servicios. En el mismo se realizan diversas intervenciones quirúrgicas, entre ellas la más frecuente la cesárea.

La operación cesárea se ha incrementado en las últimas décadas probablemente por una combinación de factores: disminución de complicaciones (infecciones, hemorragias dehiscencias, etc.), por mejor manejo de los antibióticos y la aparición de nuevas generaciones de los mismos, avance en la técnica quirúrgica, nuevos hilos de sutura etc., y también por una creciente idea de que es la solución a todas las complicaciones de un parto y a veces hasta por comodidad tanto de la paciente como del médico.

Sin embargo la cesárea sigue siendo más riesgosa que el parto normal, tanto para la madre como para el bebé, por los siguientes motivos:

- Aumenta de 5 a 20 veces el riesgo de infección (endometritis)
- Aumenta el riesgo de internación del recién nacido en neonatología
- Aumenta el riesgo de distres respiratorio neonatal.
- Aumenta el tiempo de internación materna.
- Aumenta en dolor post parto.

Sin embargo diferentes especialistas pueden diferir en cuanto a sus opiniones sobre las recomendaciones de una cesárea. Un obstetra puede decidir que una mujer es pequeña para dar a luz a su bebe pero otro puede estar en desacuerdo. De forma similar algunos proveedores de cuidado pueden determinar que el parto no progresa más rápidamente que otros. Estos desacuerdos ayudan a explicar que las tasas de cesáreas sean diferentes entre hospitales y clínicas.

En el presente estudio se identificaran algunos factores asociados en las pacientes sometidas a operación cesárea que de alguna manera influyen en el diagnostico como ser la edad, el estado civil, procedencia de los pacientes, grado de instrucción, manejo extra hospitalario, numero de gestaciones, partos, abortos y cesáreas.

1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las indicaciones médicas y los factores asociados para someter a la paciente a la Práctica de la Operación Cesárea en el Hospital San Martín de Porres. Ibuelo – Provincia Tiraque del Departamento de Cochabamba en las gestiones 2003 - 2005?