



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE GRADUADOS Y EDUCACION CONTINUA
SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIA MÉDICA



ESTUDIO DEL MANEJO DE LA
HIPERPLASIA PROSTATICA OBSTRUCTIVA
BENIGNA, EN EL HOSPITAL CLINICO VIEDMA
DE COCHABAMBA, DURANTE EL
PERIODO 2004 - 2008

Autor: Dra Pilar Lara A.
Dr. Adalid Claire C.
Medico Residente - RI
Especialidad Urología

Tutor: Dr. Antonio Lara Torrico
Cirujano Urólogo

INDICE

INTRODUCCIÓN	2
JUSTIFICACIÓN	2
TITULO DEL PROBLEMA	3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
OBJETIVOS	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos	3
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	5
Tipo de estudio	5
Area de Estudio	5
Universo y Muestra	5
Instrumento de Recolección de datos	5
MARCO TEÓRICO	6
RESULTADOS	74
CONCLUSIONES	76
RECOMENDACIONES	76
ANEXOS	77

INTRODUCCIÓN.-

Dentro de las diversas patologías urológicas la hiperplasia prostática benigna representa sin duda la más importante, no solo por la frecuencia de la misma sino por el compromiso de la calidad de vida de quien la padece.

La consulta externa de urología atiende un promedio de 4300 consultas en promedio al año, durante los últimos 5 años un total de 21.679 consultas entre nuevas y repetidas. Con un promedio de nuevas consultas de 1500 al año, de las mismas más del 45% la representan la hiperplasia prostática obstructiva y de estas más del 35% corresponden a la hiperplasia prostática obstructiva benigna. Es por todo esto es que nos interesa poder conocer el manejo de esta patología en nuestro medio además de contribuir con datos epidemiológicos sobre esta patología.

JUSTIFICACIÓN.-

La HPOB es una de las patologías más frecuentes en nuestro medio y a nivel mundial que afecta al sexo masculino, se sitúa entre el 3° lugar entre las patologías neoplásicas, se cuentan con muchos estudios a nivel internacional donde se obtienen datos estadísticos y epidemiológicos respecto a esta patología. Es por todo esto de vital importancia la correcta realización del tacto rectal, un examen muy importante en la detección temprana de patologías prevalentes en el varón adulto como el Ca colón y Ca próstata. Por lo que debe practicarse con la idea de buscar o descartar en su defecto dichas patologías.

Hasta la fecha no se cuentan con datos epidemiológicos en nuestro medio, por lo que desconocemos el estado de esta patología en nuestro medio.

Por otro lado como hospital de referencia y el único de tercer nivel en el departamento debemos desarrollar y producir información tanto estadística como epidemiológica respecto a esta patología para realizar en un futuro estudios más específicos y profundos, para tener una idea de la realidad de esta patología en nuestro medio.

Dentro del programa de la residencia la permanencia de los residentes debe ejercer una mejoría en el Servicio de Urología, lo cual se traducirá en un mejor trabajo en beneficio de los pacientes.

TITULO DEL PROBLEMA.-

ESTUDIO DEL MANEJO DE LA HPOB (HIPERPLASIA PROSTATICA OBSTRUCTIVA BENIGNA), EN EL HOSPITAL CLINICO VIEDMA DE COCHABAMBA, DURANTE EL PERIODO 2004 - 2008

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-

¿Cual es el manejo de la HPOB en el HCV durante el periodo 2004 – 2008?

OBJETIVOS.-

Objetivo General:

- Determinar el manejo de la Hiperplasia Prostática Obstructiva Benigna en el Hospital Clínico Viedma durante la gestión 2004 - 2008 en Cochabamba – Bolivia

Objetivos Específicos:

1. Determinar la edad de mayor prevalencia de la HPO.
2. Citar los hallazgos en ecografía de vías urinarias.
3. Mencionar los valores de PSA má frecuentes y su repercusión en la conducta médica.
4. Comparar la similitud en la estimación de peso entre del tacto rectal y el reporte ecografico.
5. Determinar el tipo de tratamiento mas frecuente; medico vs quirúrgico
6. Mencionar las complicaciones más frecuentes de la cirugía prostática abierta y endoscopia.
7. Determinar la frecuencia del hallazgo incidental de cáncer en el estudio histopatológico.
8. Determinar las patologías concomitantes más frecuentes.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.-

Tipo de estudio:

Estudio Retrospectivo y Prospectivo, descriptivo y transversal.

Universo :

Todos los pacientes varones que acceden a consulta externa de Urología por Hiperplasia Prostática Obstructiva Benigna, en el HCV durante el periodo 2004 – 2008.

Aproximadamente 1500 pacientes entre todos los diagnósticos y +/- 580 pacientes con diagnósticos de Hiperplasia Prostática Obstructiva Benigna.

Muestra:

Todos los pacientes diagnosticados de HPOB que hayan recibido algún tratamiento, que cumpla con los criterios de inclusión. Aproximadamente 580 pacientes.

Area.- Consulta Externa de Urología en el HCV.

Criterios de Inclusión.-

Que cuente con todos los datos completos que figuran en la hoja de recolección de datos.