


MC N
616.980 2
J73
A

1.- Medicina interna. MFN: 506
2.- Limpio
I: X Jornada de residencia medica
1996.



MED.
Tesis
- 1999.
M-588J
V. 1

TRABAJO

DE



INVESTIGACION

1.- INTRODUCCION 1

2.- MARCO TEORICO 2-4

3.- OBJETIVOS 5

4.- DISEÑO METODOLÓGICO 15

5.- VARIABLES 15a

6.- RESULTADOS 15b

7.- CONCLUSIONES 16

8.- BIBLIOGRAFIA

9.- GRAFICOS

TEMA : INCIDENCIA DE COLECISTITIS AGUDA
DE PACIENTES INTERVENIDOS EN LA
C.N.S.S. HOSP. Nº 2

AUTOR : Res. Ariel Arnez Paz Soldan.

TUTOR : Dr. Prudencio Guzmán B.

130.-
15921

NUEVO INVENTARIO
FAC. MEDICINA U.M.S.S.
No. 004017 ✓
13 de Nov de 1997

INVENTARIADO
U.M.S.S.
No. 283933
26 de febrero de 1997

1996

INDICE



Sir Zachary Cope (1965) nos ha dejado un fascinante relato de la evolución del diagnóstico y tratamiento de la colecistitis aguda. Se han hallado cálculos biliares en antiguas laparotomías y se ha asumido que sus efectos malignos datan de tiempos muy remotos. Se registraron cálculos biliares en los informes de

1.- INTRODUCCION 1

2.- MARCO TEORICO 2-14

3.- OBJETIVOS 14a

4.- DISEÑO METODOLOGICO 15

5.- VARIABLES 15a

La primera laparotomía formal con extracción de los cálculos por colecistotomía fue llevada a cabo en los Estados Unidos por

6.- RESULTADOS 15b

7.- CONCLUSIONES 16

8.- BIBLIOGRAFIA 17

9.- GRAFICOS 18-23

Se realizaron con los bordes de la incisión abdominal de modo de poder extraer cualquier otro cálculo que apareciera. La paciente se recuperó.



**UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISION DE POST GRADO**

1.- INTRODUCCION Pag. 1

2.- MARCO TEORICO Pag. 2

3.- OBJETIVOS Pag. 3

4.- DISEÑO METODOLOGICO Pag. 21

5.- TIPO DE INVESTIGACION Pag. 21

6.- UNIVERSO Pag. 21

7.- VARIABLES Pag. 22

8.- PROCESO Pag. 22

9.- RESULTADOS Pag. 23

10.- CONCLUSIONES Pag. 25

11.- DISCUSION Pag. 26

12.- RECOMENDACIONES Pag. 27

13.- ANEXOS Pag. 29

14.- BIBLIOGRAFIA Pag. 39



INCIDENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA

EN EL HOSPITAL OBRERO N° 2

CAJA NACIONAL DE SALUD

1990 - 1994

*Publicado en Acta Gastroenterologica
mayo 1997*

**Autor: Dr. Edwin Saavedra Bernal
RESIDENTE I CIRUGIA**

**Tutor: Dr. Prudencio Guzmán
JEFE DE ENSEÑANZA CIRUGIA**




INCIDENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA

EN EL HOSPITAL OBRERO N.º 1

CASA NACIONAL DE SALUD

ANOS 1990 - 1994

1.- INTRODUCCION	Pag. 1
2.- MARCO TEORICO	Pag. 3
3.- OBJETIVOS	Pag. 19
4.- DISEÑO METODOLOGICO	Pag. 21
5.- TIPO DE INVESTIGACION	Pag. 21
6.- UNIVERSO	Pag. 21
7.- VARIABLES	Pag. 22
8.- PROCESO	Pag. 22
9.- RESULTADOS	Pag. 23
10.- CONCLUSIONES	Pag. 25
11.- DISCUSION	Pag. 26
12.- RECOMENDACIONES	Pag. 27
13.- ANEXOS	Pag. 29
14.- BIBLIOGRAFIA	Pag. 39



TRABAJO DE INVESTIGACION

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA

Un agradecimiento especial a todos los médicos Gineco-obstetras, **TEMA:** de enfermería y administrativo; así como a mis compañeros y todo

ETIOPATOGENIA DEL PARTO PRETERMINO



AUTOR: DRA. MAGALY VARGAS ESCOBAR

ASESOR: DR. LUIS BAZAN ARTEAGA

Dra. Magaly Vargas Escóbar
MEDICO RESIDENTE I NIVEL
GINECO-OBSTETRICIA

**CAJA NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL OBRERO No. 2
COCHABAMBA - BOLIVIA
1995**



TRABAJO DE INVESTIGACION

SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA

INTRODUCCION. 1-10

OBJETIVO. **TEMA:** 11

DISEÑO METODOLOGICO. 11-13

ESTUDIO COMPARATIVO DE VALORES HEMATIMETRICOS CON EMBARAZO-PUERPERIO INMEDIATO Y RN. EN PACIENTES DE LA CNS.

CONCLUSIONES. 22-23

RESUMEN 24

AUTORA: Dra. Carmen del Rosario Soriano Bascopé
ASESOR: Dr. Alfredo Villarroel Goytia

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS



CAJA NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL OBRERO N° 2
COCHABAMBA - BOLIVIA
1995

INDICE

INTRODUCCION.

La adaptación de un producto en gestación a la extra-uterina exige cambios biodinámicos en todos los órganos y fluidos del ser humano, destacando aquellos ocurridos en la sangre, compuesto especializado para el transporte de sustancias vitales a todos los tejidos corporales - el oxígeno así como el desecho de ciertos metabolitos o elementos potenciales tóxicos - destacando el que serán eliminados por los pulmones.

INTRODUCCION. 1-10

OBJETIVO. 11

DISEÑO METODOLOGICO. 11-13

Normalmente, el producto "in utero" cuenta con la placenta como órgano indispensable para su crecimiento que le aporta oxígeno y sustancias nutritivas, así como remueve los impuestos innecesarios para su crecimiento.

PROCESAMIENTO. 14-16

RESULTADOS. 16-21

de ello, la hematopoyesis, ocurre en otros órganos como bazo y hígado por el cual se asocia el nombre de "extramedular".

CONCLUSIONES. 22-23

sin observar descompensación alguna, excepto si ocurre trastornos graves durante la vida intra-uterina.

RESUMEN. 24

Al nacer, prevalece la hematopoyesis medular y como el organismo ya está previamente capacitado para ello, ocurre un descenso transitorio en cifras de serie roja hasta alcanzar los valores casi equiparados a las reservas aportadas por su madre observando descenso transitorio en cifras de serie roja hasta alcanzar los valores casi equiparados a los del adulto.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 25



SISTEMA NACIONAL DE RESIDENCIA MEDICA
FACULTAD DE MEDICINA UMSS
DIVISION DE POST-GRADO
CAJA NACIONAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
HOSPITAL OBRERO No. 2

TITULO: 1.- INTRODUCCION..... Pag 1

2.- MARCO TEORICO..... Pag 4

MANEJO NORMALIZADO DE PACIENTES MENORES
DE CINCO AÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
EN EL HOSPITAL OBRERO No. 2 DE LA CAJA NACIONAL

6.- DISCUSION... DE SALUD Pag 18

7.- CONCLUSIONES..... Pag 21

AUTOR: 8.- RECOMENDACIONES..... Pag 21

DR.- LUIS NESTOR NAVARRO TUFINO..... Pag 22

RESIDENTE DE PEDIATRIA CNS..... Pag 31

TUTOR:

DR. NELSON VEGA LINARES.

COORDINADOR POST-GRADO.

PEDIATRIA CNS.

COCHABAMBA BOLIVIA
1996



MANEJO NORMALIZADO DE PACIENTES MENORES DE CINCO AÑOS CON EN **INDICE** DIARREICA AGUDA EN EL HOSPITAL OBRERO No.2 DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

1.- Introducción.

En la m	1.- INTRODUCCION.....	Pag	1	Caribe,
las enfer	2.- MARCO TEORICO.....	Pag	4	causas
más comun	3.- OBJETIVO.....	Pag	11	nores de
cinco año	4.- DISEÑO METODOLOGICO.....	Pag	13	
Las enfer	5.- RESULTADOS.....	Pag	15	anual
estimado	6.- DISCUSION.....	Pag	18	de cinco
años. Ad	7.- CONCLUSIONES.....	Pag	21	cional y
predispon	8.- RECOMENDACIONES.....	Pag	21	
Esto prov	9.- ANEXOS: TABLAS, GRAFICAS.....	Pag	22	icios de
salud, y	10.- BIBLIOGRAFIA.....	Pag	31	médicos,

enfermeras y de otros miembros del equipo de salud de todos los países. Para ayudar a resolver el problema la Organización Mundial de la Salud estableció el Programa de Control de Enfermedades Diarreicas (CED) en 1978. En los últimos años, el aumento en forma extraordinaria de las investigaciones sobre los agentes etiológicos que causan la diarrea en patogénesis y tratamiento, impulsó en gran parte el desarrollo del Programa CED. Con fundamento en los nuevos conocimientos obtenidos de las investigaciones científicas se desarrolló la fórmula de las Sales de Rehidratación Oral (SRO).



HOSPITAL OBRERO Nº 2 CAJA NACIONAL DE SALUD
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs), especialmente las neumonías, cobran en Bolivia miles de vidas de niños menores de 5 años cada año. La mayoría de estas muertes ocurre durante las primeras semanas de vida.

En este hecho interactúan una serie de factores: La MANEJO NORMATIZADO DE CASOS DE IRA CON NEUMONIA GRAVE EN MENORES DE CINCO AÑOS de condicionar la institución de tecnología y otras; la dificultad para obtener atención que recibe en un servicio cualquiera sea el nivel de complejidad.

El programa para el control de las INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS de la OMS/OPS adoptado por Bolivia desarrollado con el fin de hacer frente a la problemática que representa la elevada mortalidad secundaria a las IRAs.



Autor:

* Juana R. Terrazas Candia

Tutor:

** Dr. Nelson Vega Linares

* Residente I año Pediatría

** Médico Pediatra

ANTECEDENTES

Cochabamba - Bolivia



RESUMEN

Se trata de evaluar la valorización Clínica y Hemoaglutinación **HEMOGLUTINACION DE WIDAL** TIFOIDEA, y su confiabilidad **VERSUS HEMOCULTIVO**.

Se evalúa la **CONFIABILIDAD EN EL DIAGNOSTICO DE LA FIEBRE TIFOIDEA** en el diagnóstico de fiebre tifoidea, en el período de 1995 y enero de 1996.

A los 31 pacientes se les realizó hemograma y reacción de **RESULTADOS PARCIALES** Widal.

Se obtuvo muestra para hemocultivo solo en 18 pacientes, pues lo demás presentaban algún criterio de exclusión (Patología acompañante o tratamiento previo).

AUTORES:

- Dra. Lina Valdez F.
- Dr. Gino Pozzi
- Dr. Remberto Calvo
- Dr. Nelson Postigo

PALABRAS CLAVES.

Salmonella. Fiebre. **CNS - 1996.** Fiebre tifoidea. Reacción de Widal Hemocultivo.

COCHABAMBA - BOLIVIA



HOSPITAL OBRERO Nº 2 LA
CAJA NACIONAL DE SEGURIDAD
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación es el de demostrar la etiología, realizado en una serie de 29 casos con hemoptisis de leve a masiva (50 a 500 ml en 24 horas) en pacientes internados en el servicio de Neumología del Hospital Obrero Nº 2 de C.N.S. en el período de abril a diciembre de 1995.

TRABAJO DE INVESTIGACION
DETERMINACION ETIOLOGIA DE LA
HEMOPTISIS
1995

microbacteriológico de espectoración y fibrobroncoscopia.

La edad varió entre 19 años y 7 años, fueron 4 casos de sexo femenino y 25 casos de sexo masculino.

Fueron rentistas mineros 18 casos (trabajadores de interior mina entre 15 y 20 años).

Las alteraciones radiológicas más frecuentes infiltrado intersticial siendo el más afectado el derecho.

Endoscópicamente se observó vascularización de la mucosa bronquial 17% (cinco de los casos), ensanchamiento de carina 7% (dos de los casos), teratoma 7% (dos de los casos). El árbol bronquial más afectado fue el izquierdo 24%, siendo el lóbulo superior izquierdo el más afectado 17%.

AUTOR : Dra. María Paredes Aramayo
TUTOR : Dr. José Clavijo Maidana

