

Tesis
Med.
V735p
1996

TRABAJO DE RESIDENCIA MEDICA

COCHABAMBA 1.996

PATOLOGIA OPTALMOLOGICA PREVALENTE EN

PACIENTES QUE CONSULTARON EN RIBERALTA

Y GUAYARANERIE EN EL PERIODO DE 15 AÑOS

SI DE MAYO DE 1.995

AUTOR:

DRA. CLAUDIA VILLELA HERMAN

TUTOR:

DR. OSCAR CORTES BAPTISTA

RESUMEN

Después de haber realizado una atención especializada de Oftalmología a 712 pacientes que consultaron en la Provincia del Beni durante nuestros 17 días de estadía allí, al obtener un amplio número de consultantes con las más diversas patologías, creo oportuno poder hacer un estudio estadístico sobre el comportamiento en la patología oftalmológica.

No hubo selección de pacientes, nuestro Universo corresponde al 100 % de los pacientes consultantes en las ciudades de Riberalta y Guayaramerin, abarcando todas las edades desde meses hasta los 94 años.

A todo paciente consultante se les hizo una historia clínica, un examen externo completo, estudio de agudeza visual, toma de presión intraocular, fondo de ojo, retinoscopia y un diagnóstico final con su tratamiento más adecuado, aquellos que requirieron controles se les realizó cuantas veces fuera necesario.

El mayor número de consultantes fue en Riberalta con un 56.46 % y del sexo femenino con un 57.87 %, comportándose parecidamente en ambas ciudades. El grupo etareo de mayor porcentaje visto en Riberalta fue entre los 40-49 años con un 26.12 % y en Guayaramerin 60 ó más años en un 32.58 %.

Las patologías más frecuentes según el grupo etareo fueron en Riberalta en los menores de 1 año la Obstrucción de la vía lagrimal, entre 1 - 9 años conjuntivitis aguda en 20.83 %, entre los 10 - 19 años la conjuntivitis aguda con 20.40 %, entre los 20 - 29 años la hipermetropía y astigmatismo con 19.51 % en cada uno, entre los 30 - 39 y 40 - 49 años la hipermetropía fue más frecuente con 21.91 % y 22.02 % respectivamente, entre 50 - 59 años la presbicia con un 38.38 % y entre los 60 años y más la presbicia y catarata fueron más frecuentes con un 22.22 % en cada uno. En Guayaramerin en menores de 1 año

el estrabismo fue el más frecuente en un 50 %, entre 1 - 9 años la conjuntivitis aguda, hipermetropía y astigmatismo fueron más frecuentes con un 20 % cada uno, entre los 10 - 19 años y 20 - 29 años el astigmatismo con 34.78 % y 33.33 % entre los 30 - 39 años pterigión con 24.62 % entre los 40 - 49 años y 50 - 59 años la presbicia con 40.85 y 30.77 % respectivamente y entre los 60 años y más la catarata fue la más frecuente con un 23.92 %.

De las cirugías realizadas el mayor número fue en Riberalta con 37 cirugías en total y la catarata fue la más realizada en 40.54%, en Guayaramerín se realizaron 31 cirugías siendo las más frecuentes el pterigión y la catarata con un 41.93 % cada una.

Como conclusión podemos ver que cada ciudad se comportó - parecidamente con mayor prevalencia de conjuntivitis aguda en pacientes infantiles, problemas refractivos en los adolescentes y adulto y en mayores la presbicia y catarata - con posteriores visiones invalidantes.